Phänologie der Vögel Nordrhein-Westfalens 2014

Daniel Hubatsch

Zusammenfassung

In diesem Beitrag werden die in Nordrhein-Westfalen bekannt gewordenen Erst- und Letztnachweise von wandernden Vogelarten für das Jahr 2014 zusammengefasst. In zwei Tabellen werden die ersten bzw. letzten drei Termine für insgesamt 53 Brutvogelarten und Durchzügler angegeben. Außerdem werden für weitere 15 Arten (Wintergäste und Durchzügler) die letzten bzw. ersten drei Termine in weiteren Tabellen aufgelistet. Das Zuggeschehen im Jahresverlauf wird zudem kurz kommentiert.

Summary

Phenological records of birds in North-Rhine – Westphalia in 2014

In this paper, first and latest records of migrating bird species in North-Rhine - Westphalia are presented for 2014. For 53 breeding species and migrants, the first and last three dates are shown in two tables. For another 15 wintering and migrant species the latest and first three dates are listed in further tables. In addition, there are comments on the general picture of migration throughout the year.

☐ Daniel Hubatsch, Marktstraße 118, D-47798 Krefeld; daniel.hubatsch@googlemail.com

Manuskripteingang: 9.1.2016

Einleitung

Zum ersten Mal seit Erscheinen eines ornithologischen Jahresberichtes von Nordrhein-Westfalen werden an dieser Stelle die Datensätze zum phänologischen Auftreten gesondert ausgewertet. Ihren besonderen Platz sollen diese Beobachtungen einnehmen, um einerseits das jahreszeitliche Auftreten vieler Durchzügler in unserem Bundesland in einem Jahr prägnant und übersichtlich zusammenzufassen. Andererseits werden auf diese Weise auch diejenigen Einzelbeobachtungen herausgestellt, deren Zeitpunkt ihres ersten oder letzten Erscheinens außerhalb des für die jeweilige Art üblichen Zeitfensters einer Zugperiode liegt. So werden landesweite Extremdaten aufgezählt, was interessante Einsichten in das Kommen und Gehen vieler Arten liefert. Langfristig sollen auf diese Weise Voraussetzungen geschaffen werden, Veränderungen im Zuggeschehen nachvollziehen und evtl. unter Einbezug klimatischer Einflussgrößen phänologische Tendenzen aufzeigen zu können.

Methode

Grundlage sind die Datenbanken der Online-Meldeportale ornitho.de und vogelmeldung.de. Zeitlich ungewöhnliche Meldungen wurden von den zuständigen Kreis- und Regionalkoordinatoren oder dem Autor überprüft und bleiben ggf. hier unberücksichtigt, sofern die Beobachter ihre Meldung zurückzogen oder sich die Zweifel erhärteten. Dennoch bleibt auch dies immer eine Fremddiagnose, die vor Fehleinschätzungen nicht Halt macht. Eine Meldung wird dabei definiert über das Datum, den Ort und die Anzahl. Sobald sich demnach am selben Ort die Menge an Individuen bspw. zum nächsten Tag verändert hat, gehen wir von einer neuen Meldung aus. Beispielsweise wurde vom Teichrohrsänger der Großteil der ersten Jahresbeobachtungen in den Rieselfeldern Münster erbracht. Diese wurden immer als neue Meldung berücksichtigt, sobald sich die Gesamtzahl innerhalb des Gebietes vergrößert hat.

An olympischen Maßstäben orientiert, werden die ersten bzw. letzten drei Beobachtungen einer Zugperiode mit Gold (=Erst-/Letztbeobachtung), Silber (=Zweit-/ vorletzte Beobachtung) und Bronze (=Dritt-/ vorvorletzte Beobachtung) gekürt. Anders als im Sport wollen wir uns dabei jedoch vor jeglichem Wettkampfverhalten um die ersten/ letzten Meldungen einer Art distanzieren, da dies auch zukünftig – wie eben leider manchmal im Spitzensport – zu unlauteren Mitteln führen kann. Um phänologische "Ausreißer" zu korrigieren, wird zusätz-

Tab. 1: Erstbeobachtungen der Brutvögel und Durchzügler im Frühjahr 2014. – *First records of breeding birds and migrants in spring 2014.*

Vogelart	Mittelwert		SILBER	BRONZE
Alpenstrandläufer	12.3.	22.2. Klärteiche Zuckerfabrik	8.3. SO (bdm)	13.3. WES (gea, bec,
	160	Warburg HX (höl)	11.0 1	kev, lar, scg)
Austernfischer	16.2.	1.2. Versunken Bokelt Rhede BOR (häs)	11.2. VIE (spr)	15.2. KR (gej)
Baumfalke	14.4.	7.4. Rieselfelder MS (smo)	11.4. VIE (klh)	12.4. BN, K (wif, wtl)
Baumpieper	1.4.	26.3. Glabbach Nettetal VIE (huk)	1.4. BM, BOR, RE, VIE, WAF (wtl, hom, vsj, klh, fbo)	2.4. BOR, VIE (alt, klh)
Blaukelchen	18.3.	15.3. Klärteiche Bedburg BM (skc, srt)	16.3. BM, BO (uhn, cod, hib, jup, ktz, kri, sac)	17.3. HS, MS (tha, swi, kua)
Braunkehlchen	14.4.	13.4. südöstl. Erb Erftstadt BM (kum) → Heubachwiesen Reken BOR (scb) → Sarn Mendener Ruhraue MH (ktz)	14.4. LIP, MS (mof, lah)	15.4. HX, ST (sid, koa, voa)
Bruchwasserläufer	12.4.	1.4. Witte Venn Ahaus BOR (pff)	2.4. MS (lah)	7.4. HF (low)
Dorngrasmücke	10.4.	6.4. Urdenbacher Kämpe D (les)	8.4. RE (bek)	10.4. BM, GL (wtl, stt)
Dunkler Wasserläufer	30.3.	14.3. Ammerter Mark Gronau BOR (pon)	18.3. WES (kev)	28.3. KR (klv)
Feldschwirl	10.4.	6.4. Rieselfelder MS (lah, lim, pfm) Wahner Heide Rösrath GL (heb)	10.4. MS, VIE, KLE, HX (wld, lus, gea, koa)	11.4. MS (hüm)
Fischadler	18.3.	6.3. Bislicher Insel Xanten WES (ulf)	9.3. MI (gie)	10.3. PB (röu)
Fitis	18.3.	13.3. Entenfang Wesseling BM (wtl)	14.3. SI (saj)	20.3. MS (wtl)
Flussregenpfeifer	15.3.	13.3. Kläranlage Helfe Hagen HA (vka) ⇔ Rheinaue bei Monheim ME (bök)	14.3. VIE (klh)	15.3. MS (lah)
Flussseeschwalbe	13.4.	9.4. Reeser Meer: Südsee KLE (sus)	10.4. WES (kev, lar, bec, dda)	12.4. BOR, WES (köl, ulf)
Gartengrasmücke	11.4.	10.4. südl. Neubeckum Beckum WAF (huc) <> Stinderbachtal Erkrath ME (vds)	11.4. BOR, K, LEV, ME, WES (scb, wtl, avg, sig, bid)	12.4. BM, GM, HX, RE, WAF (wtl, mßb, aax, bcc, huc)
Gartenrotschwanz	1.4.	27.3. Grube Mittelweser Petershagen MI (lbm)	29.3. BN, BOR (tms, scb)	30.3. RE (tms)
Gelbspötter	30.4.	21.4. Brachelen Hückelhoven HS (tha)	24.4. SI (saj)	25.4. BM (cod)
Grauschnäpper	25.4.	13.4. Gadderbaum BI (wed)	21.4. PB (sfj)	24.4. COE (wal)
Grünschenkel	4.4.	28.3. Breitenbachtalsperre Hilchenbach SI (skl)	31.3. SO (pow)	3.4. SO (jor)
Kampfläufer	9.3.	5.3. Dingdener Heide Hamminkeln WES (köl, alt, bum, anc)	7.3. MS (kln, kgm, brl, prt)	8.3. PB, SO (jaa, bdm)
Klappergrasmücke	2.4.	30.3. Gosenbach SI (saj)	31.3. MS, SU (fzm, wtl)	1.4. WES (bad)
Knäkente*	9.3.	14.2. Freizeitpark Rheinaue BN (see)	21.2. UN (hes, hab)	3.3. BOR (sbb)
Kuckuck	8.4.	31.3. Baggersee Bohnen Brüggen VIE (muh)	3.4. VIE (klh)	6.4. HS, UN (hmc, hab)
Mauersegler	18.4.	17.4. Breiniger Berg Stolberg AC (lüd)	18.4. D, DU, MS, SO (koe, sju, bdf, hab, utd, scu, kam, lah, kre)	19.4. MS, OE, WES (rat, kej, bel, spd)
Mehlschwalbe	5.4.	1.4. Schiedersee Schieder- Schwalenberg LIP (soh)	3.4. MS (wed)	4.4. BM (wtl)

Vogelart	Mittelwert	GOLD	SILBER	BRONZE
Nachtigall	12.4.	10.4. MS-Uppenberg (wld)	11.4. HS (tha)	12.4. BOR, NE, WES (stm, ane, bec, lar, scg, kev, bao)
Neuntöter	2.5.	27.4. Kiebitzwiese Fröndenberg UN (zog, luh)	28.4. RE (vsj)	30.4. OE, SU (jng, kiv)
Pirol	27.4.	16.4. Billerbeck Horn-Bad Meinberg LIP (brö)	19.4. MS (dab)	21.4. BM (wtl)
Rauchschwalbe	20.3.	11.3. Rieselfelder MS (vdb, lah)	17.3. VIE (klh)	20.3. HS (tem)
Regenbrachvogel	2.4.	18.3. Hetter Emmerich KLE (dvp)	31.3. MS (sot, brd, wld, lah)	1.4. GT (fbo, püf)
Ringdrossel	2.4.	30.3. Lippeaue Selm RE (hra)	31.3. BN, GM (ptr, bka)	1.4. MI (mei)
Rohrweihe	24.3.	19.3. Rieselfelder MS (lah)	22.3. GT (otm)	23.3. BOR, MS, SO (die, vka, tmn, orp)
Rotschenkel	10.3.	7.3. Bislicher Insel Xanten WES (bec, scg, boj)	8.3. BOR, HX (jag, lit, koa)	9.3. WES (maa, scg)
Sandregenpfeifer	26.3.	15.3. Bislicher Insel Xanten WES (gea, ger, ktz, scg, kev, bms)	18.3. KLE (dvp)	19.3. MS, RE, WES (lah, vsj, bum)
Schwarzmilan	17.3.	9.3. östl. Latumer Bruch Meerbusch NE (klv)	16.3. WES (krs)	17.3. HX, LIP, MH, WES (koa, brö, ktz)
Schwarzstorch*	25.3.	12.3. Würgendorf Burbach SI (ewc)	15.3. EN (noj)	23.3. AC, HSK, LIP (wiw, rzu, seh)
Steinschmätzer	28.3.	21.3. südl. Flierich Bönen UN (glb)	25.3. MS (brd)	29.3. GL, SU(spw, him)
Sumpfrohrsänger	1.5.	29.4. Baggersee Graverdyk Tönisvorst VIE (klh, huk) >> Büren Lotte ST (küj)	30.4. RE (vsj) SO (jor)	1.5. DU, HSK, NE, OE, SO (wiw, kla, kuw, boj, jor, pww)
Teichrohrsänger	22.4.	17.4. Riesenfelder MS (lah, koa)	18.4. MS (hab, kam)	19.4. MS (küj)
Thunbergschafstelze	24.4.	18.4. Rieselfelder MS (kam)	23.4. BN, DO (smh, skc, hab, hdy)	24.4. BM, MS, ST (wtl, lah, prü, glm)
Trauerschnäpper	8.4.	2.4. Brachter Wald Brüggen VIE (klh)	4.4. UN glb)	6.4. HSK (orw)
Trauerseeschwalbe	17.4.	10.4. Auesee Wesel WES (daa)	13.4. KLE, VIE (ulf, kev, trt)	14.4. KLE (ulf)
Turteltaube	26.4.	23.4. südl. Godelheim Höxter HX (koa); Deponie Lüttelforst Schwalmtal VIE (lus)	24.4. HX, SO (koa, jor)	26.4. BM (srt, die, skc)
Uferschnepfe	3.3.	24.2. Halde-Mathias-Stinnes E (müw, rat)	26.2. KLE, ST (küj)	28.2. WES (kle)
Uferschwalbe	28.3.	8.3. Babenhausen BI (wed)	17.3. VIE (klh, hem)	23.3. VIE (huk)
Wachtel	21.4.	20.4. Königshovener Höhe Bedburg (jup) und Entenfang Wesseling (wtl) BM	22.4. ST, BM (wim, wtl)	23.4. BM, DU (jup, die, rat)
Wachtelkönig	17.5.	3.5. Körbecker Bruch Borgentreich HX (koa, sld, sid)	5.5. BM (wtl)	15.5. NE (wgh)
Waldlaubsänger	13.4.	5.4. Volksgarten D (jor)	11.4. GL (stt)	13.4. SU, WES, SU (std, sot, mrr)
Wendehals	20.4.	11.4. Wahner Heide Troisdorf SU (btk)	16.4. SU (btk)	17.4. GL (btk)
Wespenbussard	1.5.	26.4. DO, NE (kre, krr, hon)	29.4. WAF (huc)	30.4. SI, LIP (saj, kuu)
Wiesenschafstelze	29.3.	17.3. Boisdorfer See Kerpen BM (cod)	29.3. UN, WES (glb, scg, ger, gea, anc)	30.3. DO, MS, UN, WAF (kcp, pak, sci, lah, pth, kaj, kah)
Wiesenweihe	16.4.	3.4. Latumer Bruch KR (klv)	6.4. GT (sbw)	13.4. GT (hmt)
Ziegenmelker	3.5.	21.4. Kammersenne Schlangen LIP (kuu)	1.5. COE (lei, lej)	3.5. RE, PB, VIE (seh, maw, kuu, sfj, huk, hum, hud, rkj)

lich ein Mittelwert der ersten zehn Meldungen angegeben. Bei einigen Arten (Nachtigall, Wachtelkönig, Waldlaubsänger und Ziegenmelker) wurde aufgrund der heimlichen Lebensweise nach der Balz- und Brutzeit darauf verzichtet und lediglich die Letztbeobachtung genannt. Bei Arten, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, liegen Winter- bzw. Sommerbeobachtungen vor, die im Detail hier nur kurz angesprochen oder unerwähnt bleiben, jedoch im vorherigen Kapitel aufgeführt sind.

Für die Ortsangaben zum Kreis bzw. zur kreisfreien Stadt werden die üblichen Kürzel verwendet (s. S. 111 in diesem Heft).

Phänologischer Überblick der Brutvögel und Durchzügler im Frühjahr

Februar

Als frühester heimziehender Brutvogel traf am 1. der erste **Austernfischer** ein. Nachdem bereits am 2. eine **Knäkente** beobachtet wurde (als Winternachweis gewertet), erschien die nächste bereits am 14. – ebenfalls für diese Art ungewöhnlich früh. Ein **Alpenstrandläufer** am 22. war der jahreserste. Am 24. wurde die erste durchziehende **Uferschnepfe** des Jahres nachgewiesen.

März.

Der früheste Kampfläufer erschien am 5., einen Tag bevor der erste Fischadler entdeckt wurde und zwei Tage vor den ersten beiden Rotschenkeln. Sehr außergewöhnlich früh war eine Uferschwalbe am 8., die in anderen sehr frühen Individuen in Großbritannien eine Parallele findet. Bereits am nächsten Tag wurde ein sehr früher Schwarzmilan beobachtet. Ebenfalls recht früh war eine Rauchschwalbe am 11. Am 13. wurden die Erstbeobachtungen von Fitis (dieser sehr früh) und Flussregenpfeifer erbracht. Während am 14. sechs Dunkle Wasserläufer beobachtet wurden, wurden am Folgetag mit Blaukehlchen und Sandregenpfeifer zwei weitere Arten neu für das Jahr nachgewiesen. Extrem früh wurde eine Wiesenschafstelze am 17. gemeldet – ein neues Extremdatum für NRW? Am nächsten Tag erschien der erste Regenbrachvogel, am 19. die erste Rohrweihe. Der früheste Steinschmätzer zeigte sich am 21. Nach einer Winterbeobachtung (23.1.) kreiste der erste Schwarzstorch des Frühjahres am 12. am nordrhein-westfälischen Himmel. Am 26. gelang die einzige Märzbeobachtung des Baumpiepers. Recht früh war auch ein Gartenrotschwanz am 27. Am 28. erschien der erste Grünschenkel und am 30. wurde die erste Ringdrossel des Jahres gesichtet. Bemerkenswert früh waren eine Klappergrasmücke (30.) und die ersten Rufe eines Kuckucks (31.).

April

Ab dem 1. wurden Bruchwasserläufer und Mehlschwalbe nachgewiesen. Früh und bereits am nächsten Tag erschien der erste Trauerschnäpper, am 3. wurde die erste Wiesenweihe gesichtet. Bereits am 5. sang der erste Waldlaubsänger, während Dorngrasmücke und Feldschwirl am 6. folgten. Am 7. tauchte der erste Baumfalke auf. Die ersten vier Flussseeschwalben jagten am 9., einen Tag später die ersten beiden Trauerseeschwalben, während am 10. auch Gartengrasmücke und Nachtigall erstmalig zu hören waren. Ein Wendehals wurde am 11. gemeldet. Sehr ungewöhnlich früh war ein Grauschnäpper bereits am 13., am selben Tag wie die ersten Braunkehlchen des Jahres. Recht früh war auch der erste Pirol am 16. Der erste Mauersegler erschien am 17., genauso wie der früheste Teichrohrsänger. Am 18. wurde die erste Thunbergschafstelze beobachtet und am 21. jeweils sehr frühe Ziegenmelker und Gelbspötter gehört. Während die Erstankunft von Turteltaube (23.) und Neuntöter (27.) zeitlich im üblichen Rahmen lag, waren je zwei Wespenbussarde (26.) und Sumpfrohrsänger (29.) früh.

Mai

Am 3. wurde der erste **Wachtelkönig** des Jahres gehört.

Phänologischer Überblick der Brutvögel und Durchzügler im Herbst

August

Die letzte **Wachtel** wurde am 6. gehört, ein zutraulicher Vogel und wahrscheinlicher Gefangenschaftsflüchtling wurde noch am 19.10. entdeckt. Die letzte **Nachtigall** wurde bereits am 10. festgestellt. Obwohl noch am 9.9. die Teilrupfung eines **Ziegenmelkers** gefunden wurde, wurden seine spätesten lebenden Artgenossen sogar noch singend am 12. festgestellt. Am 16. wurde der späteste **Pirol** des Jahres vernommen. Vom 27. datiert die Letztbeobachtung des **Waldlaubsängers**.

September

Der letzte **Gelbspötter** wurde am 3. nachgewiesen. Die beiden spätesten **Flussseeschwalben** erschienen am 7., einen Tag später der letzte **Regenbrachvogel**. Während die beiden letzten **Wiesenweihen** am 13. beobachtet wurden, folgten am 16. die Letztbe-

obachtungen von Feldschwirl, Sumpfrohrsänger und Trauerseeschwalbe. Noch am 21. erschien ein Mauersegler, einen Tag später verabschiedeten sich die letzten beiden Turteltauben des Jahres. Vom 24. wurde der späteste Trauerschnäpper und vom 25. die letzte Thunbergschafstelze gemeldet. Mit Austernfischer, Blaukehlchen und Kuckuck verließen drei Arten am 28. NRW in ihre Überwinterungsgebiete. Der letzte Bruchwasserläufer wurde am 30. bemerkt.

Oktober

Am 3. wurde die späteste Gartengrasmücke gesehen, am 4. der letzte Rotschenkel (von dem allerdings noch zwei Winterbeobachtungen vorliegen), am 5. der letzte Grauschnäpper und am 6. die letzte Dorngrasmücke. Letztmalig wurde der Flussregenpfeifer am 8. beobachtet. Ein Teichrohrsänger wurde am 11. gemeldet, eine Mehlschwalbe noch am 12. Während die Letztbeobachtungen von Braunkehlchen (14.) und Sandregenpfeifer (15.) im herbstlichen Trubel untergingen, sorgte ein junger Neuntöter vom 14.-18. aufgrund von Bestimmungsschwierigkeiten und des sehr späten Datums für Aufsehen. Spät war am 19. eine Uferschwalbe. Einen Tag später wurden ebenfalls sehr spät noch Fitis und Wespenbussard nachgewiesen. Die letzte Ringdrossel erschien am 25., spät war noch ein Baumfalke am 26. Ein Steinschmätzer wurde noch am 29, beobachtet.

November

Außergewöhnlich spät gelang am 1. noch die Beobachtung eines Baumpiepers. Am selben Tag wurde auch der letzte Grünschenkel des Jahres nachgewiesen. Am 2. zog ein Kampfläufer durch – bemerkenswert sind jedoch noch sechs weitere Nachweise ab dem 20. bis zum Jahresende. Ebenfalls z. T. sehr spät waren noch am 8. Knäkente, Fischadler und Schwarzmilan, die letzte Rauchschwalbe wurde am 9. beobachtet. Die späteste Rohrweihe wurde am 10. nachgewiesen. Zwei Uferschnepfen rasteten vom 29.9. noch bis zum 14.11. - sehr bemerkenswert für den Wegzug! Sehr spät wurde vom 18. noch eine Wiesenschafstelze gemeldet. Die letzten sechs nur kurz rastenden **Dunklen Wasserläufer** datieren vom 13. – außerdem liegt noch eine Winterbeobachtung vor. Drei Alpenstrandläufer rasteten am 25.

Phänologischer Überblick der Wintergäste und Durchzügler im Frühjahr und Herbst

Die letzten **Singschwäne** des Frühjahres wurden am 3.3. beobachtet, der erste im Herbst erschien am 26.10. Ganzjährig hielt sich ein vor Jahren aus einem angrenzenden Tierpark entflogenes Exemplar in HF und BI auf. Ein **Zwergschwan** blieb bis zum 23.2., der nächste erschien am 20.11. Nachdem bis Mitte März nahezu alle Tundrasaatgänse ihr Überwinterungsgebiet geräumt hatten und in ihre russischen Brutgebiete aufgebrochen waren, blieben sehr vereinzelt einige noch länger im Frühjahr. Ein Vogel wurde sogar noch bis zum 2.6. an der Bislicher Insel WES beobachtet. Bereits ab dem 15.8. liegen wieder Meldungen von Einzelvögeln vor, bis in den ersten Oktobertagen die Masse eintraf. Die letzten zwei Kurzschnabelgänse rasteten am 26.2., im Herbst erschien die erste sehr früh am 6.10. Nachdem von der Pfeifente noch im Mai regelmäßige Beobachtungen aus dem Tiefland vorliegen, beschränken sich Juni- und Julimeldungen auf die Rieselfelder MS, die Bislicher Insel WES, das Steinhorster Becken PB und die Ehemaligen Klärteiche Bedburg BM (Sommerbestand ~5 Ind.); ab dem 29.7. liegen wieder Meldungen von anderen Orten vor. Beobachtungen der Spießente gab es im Frühjahr bis zum 7.5. Ab dem 21.6. wurden in den Rieselfeldern MS regelmäßig Einzelvögel beobachtet, bis am 9.8. die erste diesjährige Spießente ebenfalls dort erschien und den Wegzug markiert. Während der Großteil an **Schellenten** bis Mitte April abgezogen war, hielten sich späte Einzelvögel noch bis Mitte Mai in NRW auf. Vögel im Juni und Anfang Juli lassen sich keiner Zugperiode zuordnen. Von Mitte Juli liegen einige Nachweise vor (u. a. von einem diesjährigen Vogel am 10.7.), bis der Herbstzug Anfang Oktober signifikant an Fahrt aufnahm. Vom Zwergsäger erschien am 25.3. der letzte des Frühjahres und sehr früh, nämlich bereits am 19.10., die ersten des Herbstes. Den ganzen Sommer über jedoch haben drei weibliche Vögel im Rohrdommelprojekt bzw. auf dem De Wittsee VIE verbracht, nachdem bereits im letzten Jahr hier max. 5 Ind. übersommert haben. Bis zum 17.5. war auch noch ein Männchen anwesend und sogar Balzverhalten war beobachtet worden. Da mindestens ein Vogel beringt ist, handelt es sich wohl ausschließlich um Gefangenschaftsflüchtlinge. Außergewöhnlich lang hielt sich ein Raufußbussard auf der Königshovener Höhe BM bis zum 15.6. (!) auf, vom Wegzug liegen Daten ab dem 18.10. vor. Am 5.5. wurde der letzte Merlin des Frühjahres nachgewiesen, während ab dem 3.9. erneut Beobachtungen für den Wegzug vorliegen. Vereinzelt wurden Goldregenpfeifer noch bis zum 23.6. beobachtet, die Herbstsaison begann ab dem 1.9. Die letzte **Zwergschnepfe** auf dem Heimzug wurde recht spät, am 5.5., bemerkt; der Herbstzug begann bemerkenswert früh mit einem Vogel am 9.8. Die letzte **Rotdrossel** wurde am 3.5. bemerkt, außergewöhnlich früh erschien die erste bereits am 27.8. auf dem Wegzug. Am 4.5. wurde der letzte

Bergpieper bemerkt, die nächsten Meldungen folgen ab dem 27.9. Der letzte **Bergfink** wurde noch am 20.4. beobachtet, im Herbst liegen Beobachtungen ab dem 25.9. vor.

Tab. 2: Letztbeobachtung der Brutvögel und Durchzügler im Herbst 2014. – *Latest records of breeding birds and migrants in autumn 2014.*

Vogelart	Mittelwert	GOLD	SILBER	BRONZE
Alpenstrandläufer	10.11.	25.11. Rieselfelder MS (lah)	24.11. MS (heu)	21.11. MS (hde)
Austernfischer	30.8.	28.9. Rhein bei Bonn (hgr)	5.9. BOR (glh)	31.8. BOR, WES (glh, rül)
Baumfalke	9.10.	19.10. Hegerfeld BI (aax)	12.10. KLE, MI, SU (dvp, clj, knk)	10.10. KLE (L. Rühlke)
Baumpieper	16.10.	1.11. Königshovener Höhe Grevenbroich NE (rat, ktz)	20.10. BO (sci)	18.10. BO, MS (sci, krj)
Blaukelchen	11.9.	28.9. Steinhorster Becken Delbrück PB (kir); Bislicher Insel Xanten WES (bec, kle, kev, wit, kjö, eiv)	23.9. HS (tha)	16.9. MS (lah)
Braunkehlchen	8.10.	14.10. Düsterdieker Niederung Mettingen ST (A. Zinke)	13.10. BOR (scb)	12.10. UN (pth)
Bruchwasserläufer	22.9.	30.9. Entenfang Wesseling BM (wtl)	25.9. BM (cod)	22.9. MS (lah)
Dorngrasmücke	18.9.	6.10. Lenzbach Simmerath AC (tsp)	26.9. BI (bys)	24.9. BM (cod)
Dunkler Wasserläufer	31.10.	13.11. Rieselfelder MS (lah)	9.11. MS (lah)	5.11. MS (sjö)
Feldschwirl	1.9.	16.9. westl. Alfter SU (kce)	12.9. D (krt)	10.9. D (krt)
Fischadler	18.10.	8.11. Hürther Waldsee BM (skc, srt)	27.10. KR (vod)	19.10. BN (hgr)
Fitis	3.10.	20.10. Berrenrather Börde BM (cod)	6.10. BM (cod)	3.10. BM, NE, WES (ane, kat)
Flussregenpfeifer	25.9.	8.10. Rheinaue Monheim ME (prh)	29.9. BM (wtl)	28.9. BM (ssö, jäa, wtl, eiv)
Flussseeschwalbe	29.8.	7.9. Reeser Meer: Südsee KLE (müw, kev, ulf)	6.9. KLE (müw)	5.9. SU (pra)
Gartengrasmücke	13.9.	3.10. Klosterbusch (Botanischer Garten) BO (noj)	18.9. D (krt)	17.9. MS (lah)
Gartenrotschwanz	3.10.	19.10. nordwestl. Thomasberg Königswinter SU (fyk)	7.10. AC (tsp)	4.10. KR (vod)
Gelbspötter	14.8.	3.9. Rotthäuser Bachtal D (krt, scu)	1.9. HX (scu)	6.8. BM (wtl)
Grauschnäpper	25.9.	5.10. südl. Quernheim Kirchlengern HF (sli)	2.10. VIE (muh)	29.9. BO (sci)
Grünschenkel	19.10.	1.11. Reeser Meer: Südsee KLE (müw); Disselmersch Lippetal SO (bdm)	22.10. MS (stn)	18.10. DN, MS (köd, kaj)
Kampfläufer	21.10.	2.11. Felder südl. Hinsbeck Nettetal VIE (klh)	31.10. RE (jöm)	29.10. BOR (kle, böw, tia)
Klappergrasmücke	6.9.	11.9. Steincheskopf Burbach SI (saj)	10.9. BI (aax)	8.9. HX, SI (scu, saj)
Knäkente	7.10.	8.11. Rieselfelder MS (lah)	2.11. HX (jüu)	2.10. MS (mcs)
Kuckuck	5.9.	28.9. Krickenbecker Seen Nettetal VIE (nek)	16.9. MS (srm)	6.9. DO (hes)
Mauersegler	10.9.	21.9. BN-Friesdorf (ser)	19.9. BM (wtl)	15.9. VIE (arr)
Mehlschwalbe	3.10.	12.10. Warburg HX (höl)	9.10. WAF (huc)	4.10. PB (wem)
Nachtigall		10.8. Rötthäuser Bachtal D (scu)		
Neuntöter	16.9.	18.10. Rieselfelder MS (brd)	28.9. LIP (stz, stl)	27.9. BM (kum)
Pirol	4.8.	16.8. Knauheide Emmerich KLE (nin)	11.8. VIE (kop)	5.8. D, ST (man, daj)

Vogelart	Mittelwert	GOLD	SILBER	BRONZE
Rauchschwalbe	28.10.	9.11. nördl. Hassum Goch KLE (stm, rül)	8.11. ME (krk)	1.11. PB (kir)
Regenbrachvogel	8.8.	8.9. Aasee MS (waw)	31.8. BM (huk, hud)	28.8. HX (höl)
Ringdrossel	18.10.	25.10. Hervester Bruch Dorsten RE (vsj); nördl. Wilgersdorf Wilnsdorf SI (rog)	22.10. D (wäf)	19.10. RE (vsj)
Rohrweihe	30.10.	10.11. Emmericher Eyland KLE (gea)	9.11. WES (kßd)	8.11. MS (lah, brd)
Rotschenkel	15.9.	4.10. Rieselfelder MS (caf, rhm)	28.9. MI (bys)	18.9. MS (nou)
Sandregenpfeifer	7.10.	15.10. Reeser Meer: Südsee KLE (ulf)	12.10. KLE (maa)	10.10. MS (sjö, sgt)
Schwarzmilan	2.10.	8.11. Obersee BI (bys)	21.10. D (krt, bdr)	18.10. SU (hoa)
Schwarzstorch	28.9.	24.10. Universität Bielefeld (dab)	17.10. BN (tms)	12.10. HSK (fha)
Steinschmätzer	26.10.	29.10. Rheinaue Monheim ME (prh)	28.10. EU (rhg)	26.10. BM, D (hib, kum, wtl, ane, jup, won, wtl, kib)
Sumpfrohrsänger	6.9.	16.9. Rieselfelder MS (lah)	12.9. D (krt)	9.9. BM (köd)
Teichrohrsänger	28.9.	11.10. Teichbachaue Heinsberg HS (tha)	3.10. HS (wie, tha)	2.10. MS (lah)
Thunbergschafstelze	5.9.	25.9. südöstl. Amern Schwalmtal VIE (klh)	15.9. BM (wtl)	2.9. BM (wtl)
Trauerschnäpper	11.9.	24.9. Entenfang Wesseling BM (wtl)	21.9. DN (kri)	17.9. BM (wtl)
Trauerseeschwalbe	7.9.	16.9. Versunken Bokelt Rhede BOR (böw)	15.9. BO (sci)	14.9. BM (wac, kri, jäa)
Turteltaube	10.9.	22.9. Türnich Kerpen BM (cod)	20.9. BM (std, sck)	19.9. ME (koe)
Uferschnepfe	9.9.	14.11. Steinhorster Becken Delbrück PB (sfj)	8.10. MS (sgt)	3.10. WES (kat)
Uferschwalbe	14.9.	19.10. Dornberg BI (püf)	27.9. RE (vsj)	21.9. BI (aax)
Wachtel	26.7.	6.8. Königshovener Höhe BM (wtl)	4.8. SO (krg)	27.7. LIP (khr)
Wachtelkönig		1.7. Unteres Baarbachtal Iserlohn MK (hes)		
Waldlaubsänger		27.8. Vlatten Heimbach DN (kri)		
Wendehals	14.9.	7.10. Neue Mitte 2 OB (krr)	5.10. MH (ktz)	4.10. VIE (wcm)
Wespenbussard	2.10.	20.10. Bork Selm UN (nid)	19.10. DO (bob)	13.10. ME (man)
Wiesenschafstelze	9.10.	18.11. Entenfang Wesseling BM (wtl)	12.10. DN (kri)	11.10. BM (wtl)
Wiesenweihe	3.9.	13.9. Königshovener Höhe Bedburg BM (ktz); Sieglarer See Sankt Augustin SU (fis)	6.9. HSK (wiw)	4.9. BM (won)
Ziegenmelker		12.8. Tackenbenden Niederkrüchten VIE (kop, pes)		

Tab. 3: Letztbeobachtung der Wintergäste und Durchzügler im Frühjahr 2014. – *Latest records of wintering birds and migrants in spring 2014*.

Vogelart	Mittelwert	GOLD	SILBER	BRONZE
Bergfink	14.4.	20.4. Schlucht Brüggen VIE (spr)	18.4. VIE (spr)	15.4. VIE (spr)
Bergpieper	10.4.	4.5. Ruhraue Witten-Gedern EN (noj)	15.4. HX (höl)	11.4. BM (jup)
Goldregenpfeifer	24.4.	23.6. Hetter Emmerich KLE (gea, ger)	15.6. MS (lah, gal)	12.6. UN (glb, hes)
Kurzschnabelgans	11.2.	26.2. Reeser Ward KLE (roj) >> Rheinvorland nörd. Grindsee Rees KLE (roj)	22.2. BOR (wic)	21.2. KLE (kev)
Merlin	27.4.	5.5. Borgentreich HS (höl)	3.5. VIE (huk, hum, hud, rkj)	1.5. BM (knk)

Vogelart	Mittelwert	GOLD	SILBER	BRONZE
Pfeifente*	9.5.	24.5. Dingdener Heide Hamminkeln WES (sem)	21.5. WES (lar)	17.5. HS (gem)
Rotdrossel	11.4.	3.5. Wollerscher Wiesen Simmerath AC (rzu)	22.4. ST (scb)	18.4. LIP (kok)
Tundrasaatgans*	11.4.	2.6. Bislicher Insel Xanten WES (kre)	3.5. WES (kok)	1.5. KLE (kam)
Raufußbussard	26.3.	15.6. Königshovener Höhe Bedburg BM (lit)	20.4. NE (otd)	3.4. WES (krs)
Schellente*	1.5.	20.5. Ruhrtal nördl. Bachum Arnsberg HSK (wiw)	18.5. MI (jüu)	3.5. ME (krk, man)
Singschwan	21.2.	3.3. Rieselfelder MS (nwk, lah)	2.3. MI (aax)	1.3. KLE (häs)
Spießente*	28.4.	7.5. Rieselfelder MS (brü, bft, jum)	4.5. MS (wtl)	3.5. BN, GL (drr, caf, voi)
Zwergsäger*	10.3.	25.3. Ewaldsee GE (jaw)	14.3. BM, WES (shj, bec)	12.3. BM (die)
Zwergschnepfe	17.4.	5.5. Zuckerteiche Lage LIP (led)	3.5. DO, SU (kre, hmb, std, sck)	21.4. BI, UN (ald, hmb)
Zwergschwan		23.2. Schlüsselburger Marsch Petershagen MI (hab, hdy)	12.1. MI (möe)	

Tab. 4: Erstbeobachtungen der Wintergäste und Durchzügler im Herbst 2014. – *First records of wintering birds and migrants in autumn 2014.*

Vogelart	Mittelwert	GOLD	SILBER	BRONZE
Bergfink	29.9.	25.9. Institut Geowissenschaft MS (lbk, kaj); Rosenhof-Finkenberg BI (püf)	27.9. BI (aax)	28.9. BO, LIP, RE (sac, gat, vsj)
Bergpieper	7.10.	27.9. Am Schied Voerde WES (kok)	3.10. VIE (hum, hud)	4.10. RE (vsj)
Goldregenpfeifer	17.9.	1.9. Königshovener Höhe Bedburg BM (kuw, die)	2.9. BM (wtl)	4.9. HX (hfc, höl)
Kurzschnabelgans	10.11.	6.10. Eltenberg Emmerich KLE (wgn, ktm)	19.10. DU (kok)	25.10. COE (swi)
Merlin	13.9.	3.9. Königshovener Höhe Bedburg BM (jup)	10.9. HX (scu)	12.9. DN, RE, SO (urs, vsj, jag)
Pfeifente*	13.8.	29.7. Reeser Meer: Südsee KLE (kev)	3.8. HF (sto)	5.8. LIP, SU (gat, him)
Rotdrossel	23.9.	27.8. ehem. Klärteiche Bedburg BM (wtl)	16.9. D (krt)	18.9. D (krt)
Tundrasaatgans*	25.9.	15.8. Abgrabungssee Reeserward Rees KLE (bum, vdk)	10.9. HS (tha)	1.10. BI (kok)
Raufußbussard	3.11.	18.10. Wierlauke Lippetal SO (vwj)	19.10. NE (ssö)	26.10. OB (koe)
Schellente*	22.8.	10.7. Rieselfelder MS (lah)	12.7. BO, MI (noj, köc)	15.8. HSK (wiw)
Singschwan*	5.12.	26.10. Heubachwiesen BOR (krj)	21.11. MI (möe)	23.11. MI (low)
Spießente*	29.8.	9.8. Rieselfelder MS (hab, lah, hes, mpa)	11.8. MS (lah)	14.8. VIE (huk)
Zwergsäger*	13.11.	19.10. Reeser Meer KLE (emg)	2.11. RE (vsj)	7.11. MS (lbk, lah)
Zwergschnepfe	28.9.	9.8. Ahsewiesen Lippetal SO (pow)	19.8. SO (tpj, ktz, sjö, lmt, müa)	22.9. GM (sak)
Zwergschwan	2.12.	20.11. Recker Moor ST (lök)	21.11. WES (wäf)	24.11. WES (huk)